



FICHE D'INFORMATION SUR LE GS-441524

Le GS-441524 est un médicament antiviral qui s'est révélé très efficace dans le traitement de la péritonite infectieuse féline (PIF). Sans traitement, la PIF est mortelle dans 100 % des cas.

ADMINISTRATION DE CE MÉDICAMENT

Cette suspension orale liquide peut être administrée directement dans la bouche de votre chat à l'aide de la seringue fournie, ou mélangée à une petite quantité de nourriture ou à une friandise à lécher. Il est recommandé de donner ce médicament à jeun et d'éviter un repas copieux pendant environ une heure après l'administration.

Votre vétérinaire peut vous demander de donner ce médicament à votre chat une ou deux fois par jour. Il est très important de s'assurer que votre chat reçoit sa (ses) dose(s) prescrite(s) chaque jour. En cas d'oubli, donnez la dose dès que vous vous en souvenez, puis poursuivez le programme habituel. Cependant, si l'heure de la dose suivante est proche, sautez la dose oubliée et reprenez le calendrier normal. Le fait de ne pas administrer le médicament chaque jour comme prescrit peut entraîner un échec du traitement.

La recommandation actuelle pour le traitement de la PIF est de 12 semaines de traitement antiviral (comme avec le GS-441524). Ne stoppez pas le traitement sans consulter votre vétérinaire. L'arrêt prématuré du traitement peut provoquer une rechute et rendre votre chat de nouveau malade.

Si vous avez des difficultés à administrer ce médicament, consultez votre vétérinaire ou votre pharmacien pour des conseils sur les techniques d'administration. Pour des conseils en ligne sur la façon de donner une suspension orale liquide à votre chat, consultez les recommandations du groupe International Cat Care : <https://icatcare.org/articles/how-to-give-a-cat-medication>

FORMULATION

Forme posologique: Suspension orale

Volumes disponibles: 30 mL et plus à partir de 30 mL, l'expédition est gratuite, mais vous pouvez commander le volume que vous souhaitez

Concentration: 50 mg/mL

Saveurs disponibles: Poisson ou Poulet





STOCKAGE ET MANIPULATION

La suspension orale de GS-441524 doit être conservée à température ambiante.

Il n'y a pas de précautions particulières pour manipuler ce médicament, sauf si vous y êtes allergique. Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé ou administré un médicament.

SURVEILLANCE

Si votre chat présente de nouveaux symptômes ou une aggravation, consultez votre vétérinaire : un ajustement de la dose ou des soins de soutien supplémentaires peuvent être nécessaires.

Il est très important de surveiller le poids de votre chat chaque semaine pendant le traitement afin que la dose puisse être ajustée en cas de prise de poids. Ne pas ajuster la dose en fonction du gain de poids est l'une des principales causes d'échec du traitement.

