



FICHE D'INFORMATION GS-441524

Le GS-441524 est un médicament antiviral qui s'est révélé hautement efficace dans le traitement de la péritonite infectieuse féline (PIF). Sans traitement, la PIF est 100 % mortelle.

ADMINISTRATION DE CE MÉDICAMENT

Ce médicament, sous forme de suspension orale liquide, de comprimé ou de capsule, peut être administré directement dans la bouche de votre chat.

- **Suspension orale liquide.** Vous pouvez soit injecter directement le liquide dans la bouche de votre chat à l'aide de la seringue fournie, soit le mélanger à une petite portion de nourriture ou à une friandise qu'il apprécie.
- **Comprimé ou capsule.** Le comprimé ou la capsule peut être caché dans une petite quantité de nourriture ou une friandise appétissante, ou placé directement dans la bouche de votre chat. Il est recommandé d'administrer ce médicament à jeun. Évitez de nourrir votre chat avec un repas copieux pendant au moins une heure après l'administration.

Votre vétérinaire peut vous indiquer d'administrer ce médicament une ou deux fois par jour. Il est très important de s'assurer que votre chat reçoive la ou les doses prescrites chaque jour. Si vous oubliez une dose, donnez-la dès que possible, puis poursuivez le programme habituel.

Cependant, si l'heure de la prochaine dose approche, sautez la dose oubliée et continuez normalement. Ne pas administrer le médicament quotidiennement comme prescrit peut entraîner un échec du traitement.

12 semaines de traitement antiviral (comme avec le GS-441524) est la recommandation actuelle pour le traitement de la PIF. Ne cessez pas le traitement sans consulter votre vétérinaire. L'arrêt prématuré du traitement peut provoquer une rechute et rendre votre chat de nouveau malade.

Si vous avez des difficultés à administrer ce médicament, consultez votre vétérinaire ou votre pharmacien pour obtenir des conseils sur les techniques d'administration. Pour des conseils en ligne sur la façon d'administrer un médicament à votre chat, veuillez consulter les recommandations du groupe International Cat Care.

Comment donner un médicament à un chat – International Cat Care


<https://icatcare.org/articles/how-to-give-a-cat-medication>

FORMULATION

Forme posologique. Suspension orale
Concentration. 50 mg/mL

Volumes disponibles. 30 mL et plus (livraison gratuite au-delà de cette quantité, mais vous pouvez commander le volume de votre choix)

Saveurs disponibles. Poisson ou Poulet





FORMULATION (SUITE)

Forme posologique, Comprimés
Concentration, 50 mg / comprimé (quadri-sé-
ble)

Volumes disponibles, 30 comprimés et plus
(livraison gratuite à partir de cette quantité,
mais vous pouvez commander le nombre de
comprimés que vous souhaitez)


Saveurs disponibles, Poisson ou Poulet



Forme posologique, Capsules
Concentration, 50 mg / capsule

Volumes disponibles, 30 capsules et plus
(livraison gratuite à partir de cette quantité,
mais vous pouvez commander le nombre de
capsules que vous souhaitez)

Saveurs disponibles, Poisson ou Poulet



STOCKAGE ET MANIPULATION

La suspension orale, les comprimés ou les capsules de GS-441524 doivent être conservés à température ambiante.

Aucune précaution spécifique n'est requise pour la manipulation de ce médicament, sauf en cas d'allergie. Lavez-vous toujours les mains après avoir manipulé ou administré un médicament.

SURVEILLANCE

Si votre chat présente de nouveaux symptômes ou une aggravation de son état, consultez votre vétérinaire, car un ajustement de la dose ou des soins de soutien supplémentaires peuvent être nécessaires.

Il est très important de surveiller le poids de votre chat (chaque semaine) pendant le traitement, afin que la dose puisse être ajustée en fonction de la prise de poids.

Le non-ajustement de la dose lors d'une prise de poids est l'une des principales causes d'échec du traitement.